









大腸ポリープ切除術を受けられる患者さまへ (1泊2日)

ID:

名前:

	月 日	月 日(入院日)		月 日(退院日)
	前日	術前	術後	術後1日目
指導		朝食は食べずに9時までに入院して下さい。 入院中の生活と処置についての説明を行います。	主治医より説明があります。 	退院後の生活についてお話しします。 
処置	自宅で、夜8時頃にセンノサイド2錠(下剤)を飲んでください。 夜10時頃にマグコロールP(下剤)1袋を200ml程度の水に溶かして飲んでください。	入院後2リットルの下剤を内服します。 糖尿病で治療中の方は血糖測定があります。		
手術		大腸ポリープ切除術		
薬		飲んでいる薬の確認をします。		止血剤の薬が開始になります。
点滴・注射		 12時頃より止血剤の入った点滴を開始します。 (点滴は術後1日目の午前中まで続きます。)	→	
検査				朝に採血をとります。
食事	21時以降は絶食になります。水分は構いません。	朝から1日食事の摂取はできません。手術の2時間前まで水分はとれます。	術後は飲んだり食ったりできません。	昼から食事が開始になります
清潔	入浴できます。			午後からシャワー浴できます。
行動	制限はありません。	金属類(指輪、時計、ネックレス)入れ歯は、はずしてください。	術後2時間後からトイレまで歩行できます。	午前中は室内で過ごしてください。退院は昼食後となります。

入院の2~3日前より、ごま・海藻類・ナッツ類・種のある果物の摂取はひかえて下さい。

* 患者さまの状態により変更することもあります。

* わからないことや不安なことは何でもお話しください。

盛岡市立病院 消化器内科