

アバスチン・XELOX 療法を受けられる患者さまへ


この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
ゼローダ	内服	抗がん剤です。がん細胞の増殖に必要な酵素と結合してその働きを抑えることで、がん細胞の増殖を抑えます。
アバスチン	注射	がん組織へ栄養や酸素を補給する血管が作られないようにして、がんの成長を妨げます。また、がん組織にできた血管を整備することで、一緒に投与される抗がん剤ががん組織に届きやすくなり、その効き目を増強します。
エルプラット	注射	抗がん剤です。がん細胞の遺伝子(DNA)と結合してその合成を阻止し、がん細胞の増殖を抑え死滅させます。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えます。
アロキシ	注射	吐き気を抑えます。

《投与スケジュール》

- ゼローダは1日2回朝・夕食後に14日間服用します。
(1日目夕食後より服用を開始し、15日目朝食後まで服用します。その後、7日間お休みします。)
- 1日目にデカドロン、アロキシを点滴後、アバスチン、エルプラットを点滴します。

30分	デカドロン・アロキシ点滴静注 (生食 100ml で溶解)	
↓		
90~30分	アバスチン点滴静注 (生食 100ml で溶解)	
↓		
2時間	エルプラット点滴静注 (5%ブドウ糖液 250ml で溶解)	

- 21日ごとに繰り返します。

	1日目	2日目・・・	14日目・・・	15日目・・・	21日目
ゼローダ	夕食後より服用開始	1日2回朝・夕食後	1日2回朝・夕食後	朝食後まで服用し、その後休薬	休薬
アバスチン	点滴				
エルプラット	点滴				