

ベクティビックス・LV・5-FU 2療法を受けられる患者さまへ
 (ベクティビックス・レボホリナート・5-FU)

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
ベクティビックス	注射	ヒト上皮細胞増殖因子受容体 (EGFR) を標的とする薬剤です。EGFRに結合することでがん細胞内のシグナル伝達を妨害して、がん細胞の増殖や転移を阻害します。
5-FU	注射	抗がん剤です。がん細胞の増殖に必要な酵素と結合してその働きを抑えることで、がん細胞の増殖を抑えます。
レボホリナート	注射	5-FUの作用を強めるために使用します
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えます。
アロキシ	注射	吐き気を抑えます。

《投与スケジュール》 2週間毎に繰り返します。

30分	デカドロン・アロキシ点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
	生理食塩液 50ml 点滴静注	
60分	ベクティビックス点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
	生理食塩液 50ml 点滴静注	
2時間	レボホリナート点滴静注 (生理食塩液 250ml で溶解)	
3分	5-FU 静注	
約 46 時間	5-FU 持続注入 (携帯型ポンプにて) (生理食塩液で溶解)	

