

ベクティビックス・SOX 療法を受けられる患者さま


この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
ティーエスワン	内服	抗がん剤です。がん細胞の増殖に必要な酵素と結合してその働きを抑えることで、がん細胞の増殖を抑えます。
ベクティビックス	注射	ヒト上皮細胞増殖因子受容体（EGFR）を標的とする薬剤です。EGFRに結合することでがん細胞内のシグナル伝達を妨害して、がん細胞の増殖や転移を阻害します。
エルプラット	注射	抗がん剤です。がん細胞の遺伝子(DNA)と結合してその合成を阻止し、がん細胞の増殖を抑え死滅させます。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えます。
アロキシ	注射	吐き気を抑えます。

《投与スケジュール》

- ・ ティーエスワンは1日2回朝・夕食後に14日間服用します。
（1日目夕食後より服用を開始し、15日目朝食後まで服用します。）
その後、7日間お休みします。
- ・ 1日目にデカドロン、アロキシを点滴後、ベクティビックス、エルプラットを点滴します。
- ・ 21日ごとに繰り返します。

30分	デカドロン・アロキシ点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
↓	60分 ベクティビックス点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
↓	2時間 エルプラット点滴静注 (5%ブドウ糖液 250ml で溶解)	

	1日目	2日目…	14日目…	15日目…	21日目
ティーエスワン	夕食後より服用開始	1日2回朝・夕食後	1日2回朝・夕食後	朝食後まで服用し、その後休薬	休薬
ベクティビックス	点滴				
エルプラット	点滴				

