

IRIS 療法を受けられる患者さまへ

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬 剤 名	経路	主 な 作 用
ティーエスワン	内服	抗がん剤です。
トポテシン	注射	抗がん剤です。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えます。
アロキシ	注射	吐き気を抑えます。

《投与スケジュール》

- ・ ティーエスワンは1日2回朝・夕食後に14日間服用します。(1日目夕食後より服用を開始し、15日目朝食後まで服用します。)その後、2週間お休みします。
- ・ トポテシンは1日目と15日目に90分かけて点滴します。トポテシン点滴前にデカドロン、アロキシを点滴します。

30分 デカドロン・アロキシ点滴静注
(生理食塩液 100ml で溶解)



90分 トポテシン点滴静注
(生理食塩液 500ml で溶解)



	1日目	2日目…	14日目…	15日目…	28日目
ティーエスワン	夕食後より 服用開始	1日2回 朝・夕食後	1日2回 朝・夕食後	朝食後まで 服用し、そ の後休薬	休 薬
トポテシン	点 滴			点 滴	

- ・ 28日ごとに繰り返します。