

XELOX 療法を受けられる患者さまへ

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬 剤 名	経路	主 な 作 用
ゼローダ	内服	抗がん剤です。がん細胞の増殖に必要な酵素と結合してその働きを抑えることで、がん細胞の増殖を抑えます。
エルプラット	注射	抗がん剤です。がん細胞の遺伝子(DNA)と結合してその合成を阻止し、がん細胞の増殖を抑え死滅させます。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えます。
アロキシ	注射	吐き気を抑えます。

《投与スケジュール》

- ゼローダは1日2回朝・夕食後に14日間服用します。
(1日目夕食後より服用を開始し、15日目朝食後まで服用します。)
その後、7日間お休みします。
- エルプラットは1日目に2時間かけて点滴します。エルプラット点滴前にデカドロン、アロキシを30分かけて点滴します。

30分 デカドロン・アロキシ点滴静注



(生食 100ml で溶解)



2時間 エルプラット点滴静注

(5%ブドウ糖液 250ml で溶解)



	1日目	2日目…	14日目…	15日目…	21日目
ゼローダ	夕食後より 服用開始	1日2回 朝・夕食後	1日2回 朝・夕食後	朝食後まで 服用し、そ の後休薬	休 薬
エルプラット	点 滴				

- 21日ごとに繰り返します。