

## サイラムザ・タキソール療法を受けられる患者さまへ


この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

### 《お薬の作用》





薬剤名	経路	主な作用
サイラムザ	注射	抗がん剤です。がん組織へ栄養や酸素を補給する血管が作られないようにして、がんの成長を妨げます。
タキソール	注射	抗がん剤です。がん細胞の分裂を停止させます。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します
アロキシ	注射	吐き気を抑えるために使用します
ガスター	注射	アレルギー症状を抑えるために使用します
レスタミンコーワ	内服	アレルギー症状を抑えるために使用します

### 《投与スケジュール》

- ・ 第1日目と15日目にサイラムザとタキソールを点滴静注します。
- ・ 第8日目はタキソールだけを点滴静注します。
- ・ 第21日目はお休みします。28日間で1サイクルです。

第1日目		ガスター 静注 	レスタミンコーワ 5錠内服 
第15日目	30分	デカドロン、アロキシ 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
		↓	
		生理食塩液 50ml でフラッシュ	
		↓	
	60分	サイラムザ 点滴静注 (生理食塩液 250ml で溶解)	
		↓	
		生理食塩液 50ml でフラッシュ	
		↓	
	60分	タキソール 点滴静注 (生理食塩液 250ml で溶解)	

第 8 日目

30 分	ガスター 静注 デカドロン、アロキシ 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	レスタミンコーワ 5 錠内服  	
			
60 分	タキソール 点滴静注 (生理食塩液 250ml で溶解)	