

## ティーエスワン・ブリプラチン療法を受けられる患者さまへ



この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

### 《お薬の作用》

薬 剤 名	経路	主 な 作 用
ティーエスワン	内服	抗がん剤です。
ブリプラチン	注射	抗がん剤です。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えます。
デカドロン	内服	吐き気を抑えます。
アロキシ	注射	吐き気を抑えます。
フロセミド	注射	利尿剤です。
イメンド	内服	吐き気を抑えます。

《投与スケジュール》 \* 35日（5週間）ごとに繰り返します。

- ・ ティーエスワンは1日2回朝・夕食後、1回 錠を21日間服用します。その後、14日間お休みします。
- ・ ブリプラチンは8日目に2時間かけて点滴します。
- ・ デカドロン錠は、9日目から1回16錠を1日1回起床時に3日間服用します。

7日目	ソルデム 3A 500ml 4本 点滴静注	
8日目	①ソルデム 3A 500ml 点滴静注 2時間 ②デカドロン・アロキシ点滴静注 2時間 (ソルデム 3A 500ml で溶解) ③イメンド 1カプセル内服 (3日間服用します。) ④フロセミド静注 ⑤ブリプラチン点滴静注 2時間 (生理食塩液 500ml で溶解) ⑥ソルデム 3A 500ml 4本 点滴静注 18時間	
9日目	ソルデム 3A 500ml 4本 点滴静注	

\*ブリプラチンは腎障害を起こしやすい抗がん剤なので、尿量を増やすことで腎臓の負担を軽くする処置が行われます。そこで、ブリプラチンを投与する日とその前後1日間は点滴をたくさん受けていただきます。

	1日目…	8日目…	21日目…	22日目…	35日目
ティーエスワン	1日2回 朝・夕食後	1日2回 朝・夕食後	1日2回 朝・夕食後	休薬	休薬
ブリプラチン		点滴			