

F E C療法を受けられる患者さまへ
(ファルモルピシン・エンドキサン・5-FU)

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

製 剤 名	経路	主 な 作 用
ファルモルピシン	注射	抗がん剤です。
エンドキサン	注射	抗がん剤です。
5-FU	注射	抗がん剤です。
デカドロン	注射	吐き気やアレルギー症状を抑えます。
デカドロン	内服	吐き気を抑えます。
アロキシ	注射	吐き気を抑えます。
イメンド	内服	吐き気を抑えます。

《投与スケジュール》 * 3週間ごとに繰り返します。

- ・ デカドロン錠は、抗がん剤投与の翌日から1回16錠を1日1回起床時に3日間服用します。

① イメンド 125mg 1錠服用 (抗がん剤を投与する1時間～1時間30分前)
(治療2日目と3日目の午前中に、イメンド 80mg を1錠服用します。)

② デカドロン・アロキシ点滴静注 15分
(生理食塩液 100ml で溶解)

③ ファルモルピシン点滴静注 15分
(生理食塩液 100ml で溶解)

④ エンドキサン点滴静注 30分
(生理食塩液 100ml で溶解)

⑤ 5-FU点滴静注 15分
(生理食塩液 100ml で溶解)

