

タキソールtriweekly 療法を受けられる患者さまへ



この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
タキソール	注射	抗がん剤です
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します
アロキシ	注射	吐き気を抑えるために使用します
ガスター	注射	アレルギー症状を抑えるために使用します
レスタミンコーワ	内服	アレルギー症状を抑えるために使用します

《投与スケジュール》

- ・ タキソール(生理食塩液で溶解)を3時間かけて点滴静注します。
点滴 30分前に、レスタミンコーワ 5錠を内服し、ガスターを注射します。さらに、デカドロン、アロキシ(生理食塩液で溶解)を 30分かけて点滴静注します。
- ・ 3週間毎に繰り返します。

第1日目	ガスター 静注  レスタミンコーワ内服 
	30分 デカドロン、アロキシ 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)
	↓
	3時間 タキソール 点滴静注 (生理食塩液 500ml で溶解)
第2日目から21日目までお休みします。	