

タキソール weekly 療法を受けられる患者さまへ

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
タキソール	注射	抗がん剤です
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します
アロキシ	注射	吐き気を抑えるために使用します
ガスター	注射	アレルギー症状を抑えるために使用します
レスタミンコーワ	内服	アレルギー症状を抑えるために使用します

《投与スケジュール》

- ・ タキソール(生理食塩液で溶解)を1時間かけて点滴静注します。
点滴30分前に、レスタミンコーワ5錠を内服し、ガスターを注射します。さらに、デカドロン、アロキシ(生理食塩液で溶解)を30分かけて点滴静注します。
- ・ 1週間毎に3週間投与し、1週間お休みします。

第1日目		ガスター 静注 	レスタミンコーワ内服 
第8日目	30分	デカドロン、アロキシ 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
第15日目			
	1時間	タキソール 点滴静注 (生理食塩液 250ml で溶解)	
1 週 間 お 休 み し ま す			