

ナベルビン療法を受けられる患者さまへ







この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
ゾフランザイデイス	内服	吐き気を抑えるために使用します
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します
ナベルビン	注射	抗がん剤です
生理食塩液	注射	ナベルビンを洗い流すために使用します

《投与スケジュール》

- ・ ゾフランザイデイスを1錠服用し、デカドロンを30分かけて点滴します。その後、ナベルビンを1分間で注射し、注射部位付近に残ったナベルビンを洗い流すために、生理食塩液250mlを30分かけて点滴します。
- ・ ゾフランザイデイスは3日間服用します。
- ・ 1週間間隔で2週連続投与し、3週目はお休みします。これを繰り返します。

第1日目 と 第8日目	ゾフランザイデイス 1錠 内服 デカドロン 点滴静注 (30分) (生理食塩液 100ml に溶解)  ナベルビン 静注 (1分)  生理食塩液 250ml 点滴静注 (30分)	   
第15日目	お休みします	

《ご注意いただくこと》

ナベルビンは、血管外に漏れると皮膚障害を起こしやすいお薬です。また、血管外に漏れなくても、静脈炎や血管痛が起こることがあります。ナベルビンによる治療中またはその後、ヒリヒリと痛い感じがする、灼熱感がある、発赤がある、腫れてきた、血管の色が変化したなどが現れた場合は、すぐに医療スタッフにお知らせください。