

ハーセプチン・アブラキサン療法を受けられる患者さまへ


この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
アブラキサン	注射	抗がん剤です。(がん組織を直接攻撃します。)
ハーセプチン	注射	ヒト上皮細胞増殖因子受容体2型(HER2)を標的とする薬剤です。HER2に結合することでがん細胞内のシグナル伝達を妨害して、がん細胞の増殖や転移を阻害します。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します
アロキシ	注射	吐き気を抑えるために使用します

《投与スケジュール》

- ・ アブラキサン点滴30分前に、デカドロン・アロキシを30分かけて点滴静注します。その後、アブラキサンを30分かけて点滴静注し、ハーセプチンを90分かけて点滴静注します。
- ・ 3週間毎に繰り返します。

第1日目	<p>30分 デカドロン・アロキシ 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)</p> <p>↓</p> <p>生理食塩液 100ml 点滴静注</p> <p>↓</p> <p>30分 アブラキサン 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)</p> <p>↓</p> <p>生理食塩液 100ml 点滴静注</p> <p>↓</p> <p>90分 ハーセプチン 点滴静注 (生理食塩液 250ml で溶解)</p>	
第2日目～21日目までお休みします。		

