

アブラキサン・ジェムザール療法を受けられる患者さまへ

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
アブラキサン	注射	抗がん剤です
ジェムザール	注射	抗がん剤です
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します
アロキシ	注射	吐き気を抑えるために使用します

《投与スケジュール》

- ・ デカドロン、アロキシを生理食塩液に溶解して 30 分かけて点滴静注します。
- ・ アブラキサン(生理食塩液で溶解)を30分かけて点滴静注します。
- ・ ジェムザール(生理食塩液で溶解)を30分かけて点滴静注します。
- ・ 第1日目、8日目、15日目に行い、21日目はお休みします。
これを28日毎に繰り返します。

第1日目	30分	デカドロン・アロキシ 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
第8日目	↓		
第15日目	30分	アブラキサン 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	
	↓	生理食塩液 50ml 点滴静注	
	↓	30分	ジェムザール 点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)
22日目はお休みします。			