

## ジェムザール・ブリプラチン療法を受けられる患者さまへ

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。








### 《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
ジェムザール	注射	抗がん剤です。
ブリプラチン	注射	抗がん剤です。
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します。
アロキシ	注射	吐き気を抑えるために使用します。
イメンド	内服	吐き気を抑えるために使用します。
マンニトールS	注射	利尿剤です。

### 《投与スケジュール》

- ・ 1日目と8日目にジェムザールとブリプラチンを点滴し、15日目はお休みします。
- ・ 21日ごとに繰り返します。

#### ◆ 1日目・8日目

A	B
①生理食塩液 500ml 点滴静注 90分 	① マンニトールS 300ml 45分
②生理食塩液 500ml 点滴静注 90分 	②イメンド 125mg 1錠 服用
③生理食塩液 500ml 点滴静注 90分 	③デカドロン・アロキシ点滴静注 30分 (生理食塩液 100ml で溶解) 
	④ブリプラチン点滴静注 60分 (生理食塩液 250ml で溶解) 
	⑤生理食塩液 100ml 点滴静注 30分 (フラッシュ) 
	⑥ジェムザール点滴静注 30分 (生理食塩液 100ml で溶解) 

#### ◆ 2日目・3日目 (9日目・10日目)

午前中に、イメンド 80mg を1錠服用します。