

## ジェムザール療法を受けられる患者さまへ

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにご連絡ください。

### 《お薬の作用》

薬剤名	経路	主な作用
ジェムザール	注射	抗がん剤です
ゾフランザイディス	内服	吐き気を抑えるために使用します
デカドロン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えるために使用します

### 《投与スケジュール》

- ・ ジェムザール(生理食塩液で溶解)を 30 分かけて点滴静注します。  
点滴開始前に、ゾフランザイディスを 1 錠内服し、デカドロンを 30 分かけて点滴します。
- ・ 1 週間毎に 3 週間投与し、1 週間お休みします。

第 1 日目	ゾフランザイディス 1 錠内服 30分 デカドロン点滴静注 ↓ (生理食塩液 100ml で溶解) 30分 ジェムザール点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	  
第 8 日目	ゾフランザイディス 1 錠内服 30分 デカドロン点滴静注 ↓ (生理食塩液 100ml で溶解) 30分 ジェムザール点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	  
第 15 日目	ゾフランザイディス 1 錠内服 30分 デカドロン点滴静注 ↓ (生理食塩液 100ml で溶解) 30分 ジェムザール点滴静注 (生理食塩液 100ml で溶解)	  
1 週 間 休 薬		

