

ドセタキセル・ブリプラチン・5-FU 療法を受けられる患者さまへ

この治療で使用する内服薬・注射薬についての説明書です。わからないことや困っていることがありましたなら、いつでもご相談ください。また、何か異常を感じた場合は、すぐにお知らせ下さい。

《お薬の作用》

薬 剤 名	経路	主 な 作 用
ドセタキセル	注射	抗がん剤です。
ブリプラチン	注射	抗がん剤です。
5-FU	注射	抗がん剤です。
水溶性プレドニン	注射	アレルギー症状や吐き気を抑えます。
フロセミド	注射	尿を出してランダによる腎毒性を軽減します。
プリンペラン	注射	吐き気を抑えます。
ゾフランザイデイス	内服	吐き気を抑えます。

ソリュージェンG	注射	体液を補給します。
生理食塩液	注射	体液を補給します。
ピーエヌツイン1号	注射	栄養を補給します。
ビタジェクト	注射	ビタミンを補給します。



《投与スケジュール》

第1日目 ゾフランザイデイス 1錠 内服



A	B
① ソリューゲンG点滴静注 4時間	① 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
② 水溶性プレドニン点滴静注 1時間 (生理食塩液 100mlで溶解)	② 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
③ ドセタキセル点滴静注 1時間 (生理食塩液 100mlで溶解)	③ 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
④ ブリプラチン点滴静注 3時間 (生理食塩液 500mlで溶解)	④ 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
⑤ フロセミド点滴静注 6時間 (生理食塩液 500mlで溶解)	
⑥ 水溶性プレドニン点滴静注 1時間 (生理食塩液 100mlで溶解)	④ 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
⑦ プリンペラン点滴静注 8時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)	④ 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)

第2日目～第5日目 ゾフランザイデイス 1錠 内服



A	B
① ピーエヌツイン 1号 点滴静注 12時間	① 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
② ピーエヌツイン 1号 ビタジェクト 点滴静注 12時間	② 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
	③ 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)
	④ 5-FU点滴静注 6時間 (ソリューゲンG 500mlで溶解)

* 3～4週間お休みします。